

Plíseň na bramborách

Jde o **nejzávažnější** houbové **onemocnění brambor**. Nejprve vznikají neohrazené, vodnaté, později **hnědé skvrny** na okrajích nebo špičkách listů, které **se rychle rozrůstají**, až **zachvátí celou čepel a listy postupně zasychají**. Na rubu listů, na rozhraní zdravého a napadeného pletiva, se za vlhkého počasí objevují nevýrazné povlaky houby. **Původce** plísně bramborové **způsobuje i hnilobu hlíz**, která při zanedbané ochraně **přechází na hlízy**, zejména za deště. Hlízy pak mají na svém povrchu hnědé až ocelově šedé skvrny, které se částečně propadají. **Pletivo** pod těmito skvrnami **hnědne** a často **podléhá druhotné hnilobě**.

Kdy, jak a čím ošetřovat?

První ošetření provedte u náchylných odrůd **v době zapojení porostů v řádcích**, u ostatních odrůd na **začátku kvetení**. Podle průběhu počasí postříkujte **opakujte v 7 až 14 denních intervalech** (při **vlhčím počasí kratší intervaly**) až do sklizně. K ošetření použijte přípravek **Plíseň na bramborách, česneku a cibuli STOP** – působí **preventivně**, eradikativně a kurativně = **léčí**. V současné době jde o **nejúčinnější fungicid** na plíseň bramborovou, zabírá i po vzniku infekce, na rozdíl od ostatních přípravků je **systémový a chrání i nové přírůstky**.

TIP:

Tento přípravek můžete použít i **proti plísni na česneku a cibuli**.



Vhodná **náhrada** za
Acrobat MZ WG a Ridomil
Gold MZ Pepite

20 ml přípravku
na 400 m² brambor



Lze zakoupit pouze
u AGRO CS

017 399